Droites et plans dans l'espace: apports des outils théoriques dans l'évolution d'un travail de recherche en didactique

Céline Nihoul

Université de Mons
Département de Mathématique

UMONS

6 mai 2017

Contexte du travail

- Cours : Mathématiques générales en L1 (math, info, physique).

Contexte du travail

- Cours : Mathématiques générales en L1 (math, info, physique).
- Un premier diagnostic du cours :

Contexte du travail

- Cours : Mathématiques générales en L1 (math, info, physique).
- Un premier diagnostic du cours :
 - Étude des difficultés des étudiants.

Bilan partiel

Difficulté importante dans la description et la reconnaissance de l'objet « droite » dans l'espace à partir d'une équation cartésienne.

Contexte du travail

- Cours : Mathématiques générales en L1 (math, info, physique).
- Un premier diagnostic du cours :
 - Étude des difficultés des étudiants.

Bilan partiel

Difficulté importante dans la description et la reconnaissance de l'objet « droite » dans l'espace à partir d'une équation cartésienne.

- Étude des spécificités des notions.

Bilan partiel

Multiples représentations en termes de points de vue (Rogalski, 95) et de registres (Duval, 93).

⇒ une flexibilité importante est nécessaire et doit être développée en phase d'apprentissage (Artigue, Chartier & Dorier, 2000).

Une vue globale de la recherche

Problématique

Quel est le travail proposé par les enseignants du lycée sur l'interprétation géométrique de l'objet « droite » dans l'espace selon un point de vue cartésien ?

- Un croisement entre différents types d'études a priori :

Une vue globale de la recherche

Problématique

Quel est le travail proposé par les enseignants du lycée sur l'interprétation géométrique de l'objet « droite » dans l'espace selon un point de vue cartésien ?

- Un croisement entre différents types d'études a priori :
 - Analyse historique et épistémologique.
 - Analyse curriculaire.
 - Analyse de manuels.

Une vue globale de la recherche

Problématique

Quel est le travail proposé par les enseignants du lycée sur l'interprétation géométrique de l'objet « droite » dans l'espace selon un point de vue cartésien ?

- Un croisement entre différents types d'études a priori :
 - Analyse historique et épistémologique.
 - Analyse curriculaire.
 - Analyse de manuels.
- Une étude de terrain.

Une vue globale de la recherche

Problématique

Quel est le travail proposé par les enseignants du lycée sur l'interprétation géométrique de l'objet « droite » dans l'espace selon un point de vue cartésien ?

- Un croisement entre différents types d'études a priori :
 - **Analyse historique et épistémologique.**
 - **Analyse curriculaire.**
 - **Analyse de manuels.**
- Une étude de terrain.

Analyse historique

- Jusqu'en 1637, Algèbre et Géométrie sont deux domaines indépendants.
- Une tentative d'algébrisation de la Géométrie par Descartes.

Racine de : $z^2 = az + bb$.

Idée : $(z - \frac{a}{2})(z - \frac{a}{2}) = \frac{aa}{4} + bb$.

Posons $LM = b$ et $LN = \frac{a}{2}$.

$$NM = \sqrt{\frac{aa+bb}{4}}.$$

La racine est : $MO = \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{aa+bb}{4}}$.

- OBSTACLE : perte du sens géométrique, du côté visuel du problème.
- IDÉE DE LEIBNIZ : faire un parallèle entre le synthétique et l'analytique.

Analyse curriculaire

- Nouveaux programmes depuis septembre 2016.
- Chapitre : « Géométrie synthétique et analytique de l'espace » en 1^{ère}.

Analyse curriculaire

- Nouveaux programmes depuis septembre 2016.
- Chapitre : « Géométrie synthétique et analytique de l'espace » en 1^{ère}.
- Compétences à développer :
 - caractériser analytiquement des droites et des plans.
 - résoudre un problème géométrique en utilisant des équations de plans et de droites.
 - démontrer des propriétés géométriques en utilisant des outils synthétiques et/ou analytiques.

Analyse curriculaire

- Nouveaux programmes depuis septembre 2016.
- Chapitre : « Géométrie synthétique et analytique de l'espace » en 1^{ère}.
- Compétences à développer :
 - caractériser analytiquement des droites et des plans.
 - résoudre un problème géométrique en utilisant des équations de plans et de droites.
 - démontrer des propriétés géométriques en utilisant des outils synthétiques et/ou analytiques.
- Stratégies pédagogiques : « L'enseignant entrainera les élèves à résoudre un même problème dans des types différents de géométrie et de comparer les démarches. »

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».
- **Du savoir à enseigner** : le programme permet de comparer les démarches propres au synthétique et à l'analytique MAIS il ne mentionne pas :

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».
- **Du savoir à enseigner** : le programme permet de comparer les démarches propres au synthétique et à l'analytique MAIS il ne mentionne pas :
 - À quel(s) moment(s) ?

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».
- **Du savoir à enseigner** : le programme permet de comparer les démarches propres au synthétique et à l'analytique MAIS il ne mentionne pas :
 - À quel(s) moment(s) ?
 - À partir de quelle(s) notion(s) ?

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».
- **Du savoir à enseigner** : le programme permet de comparer les démarches propres au synthétique et à l'analytique MAIS il ne mentionne pas :
 - À quel(s) moment(s) ?
 - À partir de quelle(s) notion(s) ?
 - Comment ?

Élaboration d'un savoir de référence (1/2)

- **Du savoir savant** : un parallèle entre synthétique et analytique pour ne pas perdre « le sens géométrique ».
- **Du savoir à enseigner** : le programme permet de comparer les démarches propres au synthétique et à l'analytique MAIS il ne mentionne pas :
 - À quel(s) moment(s) ?
 - À partir de quelle(s) notion(s) ?
 - Comment ?
- Les ressources disponibles ne sont pas à jour !
⇒ nécessité de construire un savoir de référence (au sens Rogalski & Samurçay, 94).

Élaboration d'un savoir de référence (2/2)

- Choix : partir des notions de point de percée et section plane (2nd, synthétique).
- Objectifs :

Élaboration d'un savoir de référence (2/2)

- Choix : partir des notions de point de percée et section plane (2nd, synthétique).
- Objectifs :
 - s'appuyer sur des connaissances antérieures pour introduire et/ou travailler les équations de droites et de plans (repère, coordonnées, vecteur, incidence, postulats d'Euclide).

Élaboration d'un savoir de référence (2/2)

- Choix : partir des notions de point de percée et section plane (2nd, synthétique).
- Objectifs :
 - s'appuyer sur des connaissances antérieures pour introduire et/ou travailler les équations de droites et de plans (repère, coordonnées, vecteur, incidence, postulats d'Euclide).
 - résoudre en parallèle le problème géométrique dans le cadre synthétique et analytique.

Élaboration d'un savoir de référence (2/2)

- Choix : partir des notions de point de percée et section plane (2nd, synthétique).
- Objectifs :
 - s'appuyer sur des connaissances antérieures pour introduire et/ou travailler les équations de droites et de plans (repère, coordonnées, vecteur, incidence, postulats d'Euclide).
 - résoudre en parallèle le problème géométrique dans le cadre synthétique et analytique.

- Équations de tous les plans.
- Résolution de systèmes.
- Identification des droites comme intersection de deux plans.

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \frac{x-x_A}{x_u} = \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u}$.

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u} \end{cases}$.

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \frac{x-x_A}{x_u} = \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u}$.

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u} \end{cases}$.

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

- Dans l'espace, pourquoi a-t-on besoin d'un système de deux équations cartésiennes pour décrire une droite ?

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x - x_A = \frac{y - y_A}{y_u} = \frac{z - z_A}{z_u} \end{cases}$

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \begin{cases} \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \end{cases}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y - y_A}{y_u} = \frac{z - z_A}{z_u} \end{cases}$

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

- Dans l'espace, pourquoi a-t-on besoin d'un système de deux équations cartésiennes pour décrire une droite ?
- Les exercices utilisent la même démarche : paramétrique $\rightarrow$ cartésien.

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \frac{x-x_A}{x_u} = \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u}$.

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y-y_A}{y_u} = \frac{z-z_A}{z_u} \end{cases}$.

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

- Dans l'espace, pourquoi a-t-on besoin d'un système de deux équations cartésiennes pour décrire une droite ?
- Les exercices utilisent la même démarche : paramétrique $\rightarrow$ cartésien.
- Le registre algébrique est omniprésent.

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{cases} = \begin{cases} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{cases}$

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \begin{cases} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{cases} = \begin{cases} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{cases}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y - y_A}{y_u} = \frac{z - z_A}{z_u} \end{cases}$

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

- Dans l'espace, pourquoi a-t-on besoin d'un système de deux équations cartésiennes pour décrire une droite ?
- Les exercices utilisent la même démarche : paramétrique $\rightarrow$ cartésien.
- Le registre algébrique est omniprésent.
- Aucun parallèle avec la géométrie synthétique.

Analyse de manuels

3. Comment déterminer des équations cartésiennes d'une droite ?

En éliminant λ entre les équations du système (2), on obtient des équations cartésiennes de la droite d , définie par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}(x_u; y_u; z_u)$.

1. Si $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x - x_A = \frac{y - y_A}{y_u} = \frac{z - z_A}{z_u} \end{cases}$

Si la droite d est définie par les points $A(x_A; y_A; z_A)$, $B(x_B; y_B; z_B)$ et si $(x_B - x_A) \neq 0$, $(y_B - y_A) \neq 0$ et $(z_B - z_A) \neq 0$, alors $AB = \begin{cases} \frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \end{cases}$.

CQFD 1^{ère}

2. Si $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ \frac{y - y_A}{y_u} = \frac{z - z_A}{z_u} \end{cases}$

On obtient un système analogue si

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$
- $x_u \neq 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

3. Si $x_u = 0, y_u = 0$ et $z_u \neq 0$, alors $d = \begin{cases} x = x_A \\ y = y_A \end{cases}$.

La troisième équation du système d'équations paramétriques $\begin{cases} x - x_A = 0 \\ y - y_A = 0 \\ z - z_A = \lambda z_u \end{cases}$ peut en effet être

supprimée. Pour tout point $P(x; y; z)$ de l'espace, cette équation est vérifiée pour une et une seule valeur de λ : celle obtenue en isolant λ dans cette équation. On ne pouvait pas éliminer les équations analogues dans les cas précédents, car il y en avait plusieurs: pour tout point donné, elles n'étaient pas nécessairement vérifiées pour une même valeur de λ .

On obtient des résultats analogues si:

- $x_u \neq 0, y_u = 0$ et $z_u = 0$;
- $x_u = 0, y_u \neq 0$ et $z_u = 0$.

- Dans l'espace, pourquoi a-t-on besoin d'un système de deux équations cartésiennes pour décrire une droite ?
- Les exercices utilisent la même démarche : paramétrique $\rightarrow$ cartésien.
- Le registre algébrique est omniprésent.
- Aucun parallèle avec la géométrie synthétique.

$\Rightarrow$ Manques importants pour développer la flexibilité attendue et l'interprétation géométrique des objets de l'espace.

Perspectives

- Analyse du travail proposé par les enseignants sur ces notions : comment combrent-ils éventuellement ces manques ?

Perspectives

- Analyse du travail proposé par les enseignants sur ces notions : comment combent-ils éventuellement ces manques ?
- HYPOTHÈSE : les ajouts dans leur discours permettant un rapprochement avec les connaissances déjà là des élèves peuvent développer l'interprétation géométrique des objets dans l'espace.
⇒ notion de proximité-en-acte (Robert & Vandebrouck, 14).

Perspectives

- Analyse du travail proposé par les enseignants sur ces notions : comment combent-ils éventuellement ces manques ?
- HYPOTHÈSE : les ajouts dans leur discours permettant un rapprochement avec les connaissances déjà là des élèves peuvent développer l'interprétation géométrique des objets dans l'espace.
⇒ notion de proximité-en-acte (Robert & Vandebrouck, 14).

Problématique de recherche

Quelles sont les proximités discursives tentées par les enseignants du lycée pour amener les élèves à développer la flexibilité entre les registres et les points de vue et à interpréter géométriquement les objets ?