

Comparaison des symptômes dépressifs (et anxieux) subcliniques dans le vieillissement sain, la maladie d'Alzheimer et la dépression majeure après 60 ans.

Sandra INVERNIZZI, Isabelle SIMOES LOUREIRO, Laurent LEFEBVRE



Dépression majeure

Critères DSM 5

Anhédonie

Humeur
Dépressive

5 symptômes

Appétit

Sommeil

Dévalorisation

Psychomoteur

Energie

Cognition

Pensées
morbides

dont au moins 1 principal

Maladie d'Alzheimer



INTRODUCTION

Maladie d'Alzheimer

Symptomatologie dépressive / anxieuse propre ?

*Symptomatologie dépressive – Alzheimer :

- inquiétude cognitive
- absence de retrait
- absence de désespoir

*Stade sévère, la dépression :

- diminuée
- dominée par agitation - agressivité - psychose

*Shdo et al., 2020

**Lopez et al., 2003



INTRODUCTION



	Groupe Contrôle	Groupe Dépression	Groupe Maladie d'Alzheimer
Participants	155	47	59
années études	12,93 (2,7)	11,32 (3,24)	11,27 (2,8)
MMSE	28,96 (1,07)	28,54 (1,49)	25,74 (2,67)
âge	66,53 (5,11)	70,89 (8,3)	75,13 (8,32)

SYMPTÔMES DÉPRESSIFS ET ANXIEUX

Beck depression inventory (21 items)

Geriatric depression scale (30 items)

Spielberger Anxiety Inventory

Trait (20 items)

État (20 items)


Beck, A. T., et al. (1996). *Beck depression inventory (BDI-II)*, Pearson.

Yesavage, J. A. (1988). "Geriatric depression scale." *Psychopharmacol Bull* **24**(4): 709-711.


Spielberger, C. D. (2010). "Test anxiety inventory." *The Corsini encyclopedia of psychology*: 1-1.

MÉTHODE

BECK DEPRESSION INVENTORY (21 ITEMS)




GERIATRIC DEPRESSION RATING SCALE (30 ITEMS)



p value significative: * = 0,05 ; ** <0,01; *** <0,001


STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY : ETAT (20 ITEMS)

* p value significative <0,001



STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY : TRAIT (20 ITEMS)

* p value significative <0,001



Maladie d'Alzheimer

Symptomatologie dépressive/anxieuse typique

Conclusion préliminaire

Mesures des symptômes avec la Beck Depression Rating Scale

Différences de tous les symptômes entre :

- Groupe **dépression** et groupe **Contrôle**
- Groupe **dépression** et groupe **MA**

Pas de différences entre :
Groupe **contrôle** et groupe **MA**

Exception :

•**Symptôme *Indécision*** :
présent dans MA mais pas chez groupe contrôle

•**Difficulté de *Concentration*** :
pas de différence entre groupe dépression et
groupe MA

Mesures des symptômes avec la Geriatric Depression Rating Scale

Différences de tous les symptômes entre :

- Groupe **dépression** et groupe **Contrôle**

Différences significatives entre :
Groupe **contrôle** et groupe **MA** seulement pour
Désengagement émotionnel
Absence de bien-être global
Manque d'énergie
Difficulté de concentration et mémoire

Pas de différence entre :
Groupe **dépression** et groupe **MA** pour
Difficulté de Concentration
Absence de bien-être global

TAKE HOME MESSAGE



Mesurer les symptômes dépressifs dans la maladie d'Alzheimer nécessite des critères spécifiques



La BDI différencie la dépression de la MA mais pas la GDS



La GDS différencie la MA des âgés sains, mais pas la BDI



Etat et traits anxieux sont équitablement hauts dans MA et dépression, sauf pour trait "absence de bien-être" qui est plus marqué dans la dépression

Comparaison des symptômes dépressifs (et anxieux) subcliniques dans le vieillissement sain, la maladie d'Alzheimer et la dépression majeure après 60 ans.

Sandra INVERNIZZI, Isabelle SIMOES LOUREIRO, Laurent LEFEBVRE



Merci !



Directeur de Thèse
Pr. Laurent LEFEBVRE



Co-directrice de Thèse
Pr. Isabelle SIMOES LOUREIRO

